

El 52,8% de los médicos afirma que sólo se hacen test a los sanitarios sintomáticos o en contacto con positivos sin EPI

- Es uno de los resultados más destacados de la nueva Encuesta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) contestada por 1.210 profesionales de todo el país entre el 24 de abril al 6 de mayo. Su objetivo era hacer una fotografía de la situación actual, especialmente ahora que se ha iniciado la fase de desescalada en la que el primer nivel tiene un papel importante en la detección precoz de los nuevos casos.

Madrid, 13 de mayo de 2020 – Una reciente encuesta realizada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) para conocer la situación actual en la que se encuentran los profesionales sanitarios ante la pandemia COVID-19 -especialmente los de Atención Primaria-, revela nuevos datos sobre la desprotección en la que se encuentran los médicos del primer nivel asistencial.

El 52,8% de los encuestados afirma que se están haciendo test a los profesionales sanitarios, pero solo a los sintomáticos o con contacto estrecho con caso positivo sin uso de equipos de protección individual (EPIs). El 24% de los profesionales señala que no se están haciendo test a los sanitarios, frente a un 23,2% del total que afirma que si se están haciendo test a todos los trabajadores. En cuanto al tipo de test que se está realizando al personal sanitario, son PCR según el 65,8% de los encuestados; mientras que el resto señala el test rápido de anticuerpos de una banda (25,1%), el test rápido de anticuerpos de doble banda (22,7%) y el test rápido de antígenos (8,1%).

Este nuevo sondeo, llamado ‘Los profesionales ante el COVID-19: la nueva gestión de casos en Atención Primaria’ ha sido contestado por 1.210 profesionales de todo el país entre el 24 de abril al 6 de mayo. Su objetivo era hacer una fotografía de la situación actual, en comparación con la [anterior encuesta](#) de la SEMG realizada a mediados de marzo, especialmente ahora que se ha iniciado la fase de desescalada en la que el primer nivel tiene un papel importante en la detección precoz de los nuevos casos.

De los 1.210 profesionales que contestaron la encuesta, el 82,7% eran médicos de Atención Primaria. El resto de categorías profesionales que han participado han sido MIR de Medicina Familiar y Comunitaria (6,9%); facultativos de otras especialidades médicas (5,5%), y, en porcentajes muy inferiores, Enfermería de Atención Primaria y hospitalaria, EIR de Medicina Familiar y Comunitaria, etc.

Una de las preguntas de la encuesta hacía referencia a si los profesionales disponían, en su ámbito de trabajo, de las medidas de protección frente al COVID-19. Los resultados más destacados fueron que si hay cantidad suficiente de mascarillas quirúrgicas (857 encuestados

señalaron que sí). Los profesionales también respondieron que sí, pero en cantidad insuficiente, en el caso de las mascarillas N95, FFP2 y FFP3 (según 725 encuestados), batas impermeables (según 652 encuestados), equipos completos insuficientes (según 624 encuestados) y protectores oculares (según 524 encuestados). Las respuestas en relación a que no hay ninguna disponibilidad fueron inferiores, destacando solo la referente a los equipos completos (369 encuestados respondieron que no tenían en su centro).

Este nuevo sondeo de la SEMG revela que la situación no ha mejorado con respecto a la encuesta anterior, dado que sólo el 23,2% de los profesionales sanitarios afirma que sí se consigue poner y quitar con suficiente seguridad los equipos de protección individual (EPIs) de los que dispone. En esta misma pregunta, el 26,7% afirmó no disponer de los EPIs recomendados, por lo que el proceso de colocarlo y quitarlo no está estandarizado.

En cuanto al acceso a los test y pruebas para la detección del COVID-19 entre sus pacientes, la encuesta de la SEMG revela que los sanitarios no tienen acceso especialmente a los test de antígenos (835 respuestas); a la petición de TAC (666 respuestas) y a los test de anticuerpos (637 respuestas). Sin embargo, sí que tienen acceso y sin limitaciones, siempre que sea necesario, a la petición de Radiología (748 respuestas) y a la analítica completa (490 respuestas). En el caso de los test PCR, 702 contestaron que sí tienen acceso a los mismos, pero con muchas restricciones.

En cuanto a la percepción del nivel de protección por parte de los trabajadores en su puesto de trabajo, también mejora la puntuación (de 0 a 10) con respecto a la encuesta anterior, ya que la mayoría de los profesionales encuestados ha contestado le darían un 5.4 de media (frente a los 4.1 del anterior sondeo de marzo). Sin embargo, el nivel de preocupación de los profesionales ante la pandemia actual crece y sigue siendo muy elevado, situándolo la mayoría de los encuestados en el 8.6 (en la anterior encuesta fue del 7.4).

Preguntas abiertas

Las palabras que más utilizaron los profesionales para describir la situación actual, en una de las preguntas abiertas de la última encuesta de la SEMG, fueron incertidumbre, caos, inseguridad, improvisación, desastre, abandono, desorganización, descoordinación, agotamiento, ansiedad, impotencia, cansancio, indignación, confusión, mala gestión, desconcierto, etc.

Así mismo, un total de 496 encuestados dejaron sus comentarios en la encuesta, contenido que desde la SEMG se estudiará y que pone a disposición de las Autoridades sanitarias por si consideran necesario analizarlos en vistas de introducir futuras medidas. “Continuamente están cambiando los protocolos; la disponibilidad de test llega tarde con respecto al momento epidemiológico. No hay consenso entre las actuaciones a realizar entre servicios de Urgencias, Atención Primaria y Medicina Interna”, según afirma uno de los profesionales que ha participado en la encuesta.



SEMG
Sociedad Española de Médicos
Generales y de Familia

NOTA DE PRENSA

Para más información contactar con:

Sonia Morales (Comunicación SEMG)

Teléfono de contacto: 626 301 370

Email: gabinetecomunicacion@semg.es