Tos Ferina

VACUNÁNDOTE LE PROTEGES

La mejor forma de proteger al bebé es la vacunación de su entorno más cercano

¿Quién debe vacunarse?

Debe vacunarse cualquier adolescente o adulto (abuelos, cuidadoras...) en contacto estrecho con el bebé.

- Padres*
- Abuelos
- Contactos domiciliarios
- Personal sanitario
- Cuidadores de guarderias

*Las autoridades sanitarias de varios países como Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Colombia, Costa Rica y Nueva Zelanda recomiendan la vacunación de las embarazadas en las últimas semanas de la gestación.

¿Cuándo vacunarse?

La vacunación de todos los futuros contactos domiciliarios de los lactantes menores de 6-12 meses debe realizarse, al menos, 2 semanas antes del nacimiento.

La vacunación frente a la tos ferina no afecta a la lactancia materna.
Pregunta a tu Pediatra.

Consulta a tu Médico sobre la Vacunación frente a Difteria, Tétanos y Tos Ferina

REFERENCIA:
Campins M. et al. Tos ferina en España. Situación epidemiológica y estrategias de prevención y control. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Tos ferina. Enferm Infect Microbiol Clin. 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.eimc.2015.12.011